



---

**Если у вашего друга наблюдаются приведенные ниже симптомы, возможно, у него передозировка.**

- Он не просыпается.
- Не дышит каждые 3–5 секунд.
- Кожа имеет синеватый, серый или фиолетовый оттенок, либо холодная на ощупь.

---

**Если вам кажется, что у вашего друга передозировка, дайте ему налоксон (Narcan) и позвоните по номеру 911.**

На территории штата Вашингтон действуют положения Good Samaritan (Закон доброго самаритянина), защищающие спасателя и пострадавшего от преследования за хранение наркотиков.

## Как пользоваться налоксоном

Сначала переведите человека в положение лежа.

### 1. Откройте упаковку

Не брызгайте, чтобы проверить.  
Спрей рассчитан на одну дозу.

### 2. Держите баллончик вот так

### 3. Вставьте наконечник спрея в любую ноздрю

Ваши пальцы должны  
касаться носа.

### 4. Нажмите на поршень до упора.



Затем сделайте искусственное дыхание. Если человек не пришел в сознание в течение 2–3 минут, дайте еще одну дозу налоксона.

Продолжайте делать искусственное дыхание и давать налоксон, пока человек не придет в сознание или пока не прибудет помощь.



**Чтобы узнать больше,  
посетите сайт:**

**WAFriendsForLife.com**

Washington State  
Health Care Authority