



У вашого друга може бути передозування, якщо:

- він не прокидається;
- він не робить вдихи кожні 3–5 секунд;
- колір шкіри має синюватий, сіруватий чи фіолетовий відтінок, або шкіра холодна на дотик.

Якщо ви підозрюєте, що у вашого друга передозування, телефонуйте за номером 911 і дайте йому налоксон (Narcan).

На території штату Вашингтон діють положення Good Samaritan (Закон доброго самарянина), які захищають вас і ваших близьких від кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

Спосіб використання ін'єкційного налоксону

Спочатку переведіть людину
в положення лежачи.

1. Відкрийте упаковку

Зніміть ковпачки з флакона й шприца.

2. Введіть голку шприца у флакон

Проколіть гумове ущільнення.

Переверніть флакон і заповніть
шприц рідиною.



3. Введіть голку шприца у великий м'яз

За потреби введіть голку
через одяг.



4. Введіть повну дозу налоксону

Після цього зробіть людині штучне
дихання. Якщо вона не прокидається
впродовж 2–3 хвилин, дайте їй ще одну
дозу налоксону.

Продовжуйте робити штучне дихання та
давати налоксон, поки людина не отямиться
або доки не прибуде допомога.



Дізнайтеся більше за посиланням
WAFriendsForLife.com

Washington State
Health Care Authority