



**Ai cũng xứng
đáng được sống
và ai cũng có
thể là người
bạn tri kỷ.**

**ĐẢM BẢO AN
TOÀN CHO BẠN
BÈ CỦA QUÝ VỊ.
MANG THEO
NALOXONE
(NARCAN).**



**Tìm hiểu thêm tại
WAFriendsForLife.com**

Washington State
Health Care Authority

**Hầu hết các trường hợp tử vong do
dùng thuốc quá liều ở Washington
đều liên quan đến fentanyl.**

**Naloxone giúp đảo ngược tình trạng
quá liều opioid, bao gồm trường hợp
quá liều do fentanyl.**

SỰ THẬT VỀ FENTANYL

Tác dụng mạnh. Không thể dự đoán trước. Nguy hiểm.

- Fentanyl là một loại opioid tổng hợp mạnh, có tác dụng nhanh nên tình trạng quá liều thường xảy ra rất nhanh.
- Quý vị có thể vô tình uống phải fentanyl đã được thêm vào thuốc, cocaine, MDMA hoặc heroin.
- Một viên thuốc, một liều thuốc hoặc một lần tiêm có thể gây tử vong do quá liều.

TÌM HIỂU VỀ NALOXONE

An toàn. Dễ sử dụng. Hợp pháp.

- Naloxone là loại thuốc có tác dụng đảo ngược tình trạng quá liều opioid.
- Bất cứ ai cũng có thể lấy, mang theo và sử dụng naloxone – quý vị không cần được đào tạo đặc biệt.
- Thuốc này có sẵn miễn phí ở nhiều nơi trong cộng đồng hoặc quý vị có thể mua ở các hiệu thuốc.
- Washington có một lệnh thường trực hoạt động giống như một đơn thuốc, vì vậy quý vị không cần phải có đơn thuốc đó.
- Thuốc này không gây nghiện và không gây tổn thương cho bất cứ ai, ngay cả khi họ không sử dụng opioid.

BẠN BÈ CỦA QUÝ VỊ CÓ THỂ BỊ QUÁ LIỀU NẾU HỌ:

- Không thể tỉnh dậy.
- Không hít thở sau mỗi 3 – 5 giây.
- Cơ thể dần chuyển sang màu xanh, xám hoặc tím hoặc da của họ lạnh.

Nếu quý vị cho rằng bạn mình đang bị quá liều, hãy gọi 911. Sau đó cho họ uống naloxone và hô hấp nhân tạo.

Tiểu bang Washington có Luật Người Samari Nhân Hậu để bảo vệ quý vị và bạn của mình khỏi bị truy tố vì tội tàng trữ ma túy.


CÁCH SỬ DỤNG THUỐC XỊT MŨI NALOXONE

Ban đầu, hãy đặt người đó nằm xuống đất.

1. Mở bao bì

Không xịt thử.

Bình này chỉ có một lần xịt.



2. Giữ bình như thế này



3. Đưa vòi vào một trong hai lỗ mũi

Ngón tay quý vị nên chạm vào mũi của họ.



4. Nhấn ống bơm hết cỡ

Naloxone sẽ bắt đầu hoạt động trong 2 – 3 phút.

